



Samtykkeerklæring og information om behandling med Teosyal Redensity 2

Teosyal Redensity 2 er en steril gele, der består af vand, et mix af stabiliseret og ikke stabiliseret hyaluronsyre 15mg/ml, Aminosyrer (glycin, L-prolin, L-lysin, HCl, L-Valin og L-alanin, Theonin, Isoleucine), antioxidant (Glutathione, N-Acetyl-LCystein, Alpha-Lipoic Acid) Mineraler (kobber og Zink) Vitamin B6 og 0,3 % Lidocain, som er en lokalbedøvelse.

Teosyal Redensity 2 anvendes primært til rander under øjne og kan også anvendes til linjer over læben. Teosyal Redensity 2 er en injektionsbehandling, der lægges ind med fin nål eller cannula nål.

En behandling giver et langvarigt, men ikke permanent resultat. Vi forventer en holdbarhed på 6-12 måneder.

Der anbefales en kontrol ca. en måned efter behandlingen med henblik på evaluering af resultatet og stillingtagen til eventuel opfølgende behandling, hvorved resultatet holder længere.

Teosyal Redensity 2 behandlingen gives ikke til gravide og ammende.

Normale reaktioner umiddelbart efter behandlingen

Der ses mindre rødme, ømhed, hævelse og kløe i det behandlede område. Der kan opstå enkelte blå mærker. Alle gener forsvinder som regel efter et par dage.

Nogle har haft gavn af at tage antihistamin, der kan købes i håndkøb.

Komplikationer

I sjældne tilfælde er der rapporteret følgende, udover de normale reaktioner:

- Let blålig farve i det behandlede område.
- Infektion

Hvis der, mod forventning, skulle opstå nogen af de ovennævnte komplikationer, eller andet, der bekymrer dig, er det VIGTIGT, at du kontakter klinikken med det samme på vores AKUT-telefon, da vi har den nødvendige ekspertise og læger til at håndtere sådanne situationer. Jo hurtigere man kommer i behandling, jo bedre, og vi vil hellere have en opringning for meget end en for lidt.

Det er muligt at opløse Teosyal Redensity 2, hvis der mod forventning skulle opstå et uønsket resultat.

AKUT-telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 3160 9959.

Husk efter behandlingen

- Undgå store temperaturforskelle i et par dage, dvs. solarium og sauna, samt hård træning den første dag.
- Undgå at røre de behandlede områder i seks timer og brug ikke makeup samme dag.
- Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre (f.eks. Kodimagnyl, Hjertemagnyl eller Treo), har du større tendens til blå mærker. Det anbefales at holde pause med fiskeolie et par dage før og efter behandlingen.
- Hvis du tidligere har haft et forkølelsessår i området, er der en risiko for, at kanylehullerne kan fremprovokere et nyt udbrud. Der anbefales t.b. Valaciclovir, som fås på recept hos egen læge.
- Undgå at plukke hår i det område, hvor behandlingen udføres, samme dag.

Klinikken kan kontaktes ved spørgsmål på tlf. 7027 3366 og efter lukketid på tlf. 3160 9959.

Information og samtykke

Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med behandling med Teosyal Redensity 2.

Min behandler har givet mig mulighed for at stille spørgsmål, og jeg har haft mulighed for at medbringe en bisidder ved konsultationen. Jeg har fået tilfredsstillende svar på mine spørgsmål. Jeg har haft to dages betænkningstid inden min behandling.

Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.

Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet.

N'AGE, den _____

Navn (blokbogstaver)

Underskrift

Revideret sep. 2026 / CZ / Næste revidering dec. 2027